

JA東びわこ オリジナル企画

スギナ・ツユクサも100倍で枯らす！

農林水産省登録 第22902号

ホクコー

ザクサ

液剤

有効成分 グルホシネートPナトリウム塩・・・11.5%



お得な
5ℓも
あります

もっと
お得な20ℓも
あります



➤ 雨に強い！

散布後 **1時間** 程度降雨がなければ、効果に大きな影響はありません。

➤ 畦を崩さない！

根を枯らさないので、畦畔や傾斜地が崩れにくいです。

➤ 電気柵下でも使える！

薬液が電線に付着しても、影響が出た事例はありません。

➤ 土に優しい！

有効成分は土中の微生物等により速やかに分解されるため、散布2～3日後には作物をは種・定植できます。



今ならもれなく...

500ml、2ℓ
購入の方に



背抜き手袋をプレゼント！

5ℓ、20ℓ
購入の方に



べんりっこバケツプレゼント！

お求めは...

JA東びわこ

彦根営農経済センター TEL:0749-28-9830
愛荘営農経済センター TEL:0749-42-7000
稲枝営農経済センター TEL:0749-43-3222
東部営農経済センター TEL:0749-35-4411



除草剤用キリナシノズルで

雑草全体にたっぷり散布してください！

ご注意！少量散布ノズルでは散布量が少なくなるため十分な効果が発揮されません。

■ザクサ液剤の適用内容（抜粋）

2023年2月末日現在の適用内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量（10aあたり）		総使用回数 ※1
			薬量 (ml)	希釈水量 (L)	
果樹類 (かんきつ、りんご、 びわ、いちじょう(種子)、 くり、キウイフルーツ、 食用桑(果実)、 さんしょう(果実)を除く)	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	300~500	100~150	3回以内
	多年生雑草		500~1000		
かんきつ、りんご、 びわ、キウイフルーツ	一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	300~500	100~150	3回以内
	多年生雑草		500~1000		
くり	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期)	300~500	100~150	3回以内
	多年生雑草		500~1000		
いちじょう(種子)	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	300~500	100~150	3回以内
	多年生雑草		500~1000		
食用桑(果実)	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期 春期萌芽前 及び夏切り後萌芽前)	300~500	100~150	3回以内
	多年生雑草		500~1000		
さんしょう(果実)	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	300~500	100~150	2回以内
	多年生雑草		500~1000		
そば		は種前(雑草生育期)	300~500	100~150	3回以内
豆類(種実、ただし、 らっかせいを除く)		収穫28日前まで (雑草生育期 は種・定植前 又は陸間処理)			
豆類(未成熟、ただし、 えだまめを除く)		収穫前日まで (雑草生育期 は種・定植前 又は陸間処理)	300~500	100~150	3回以内
えだまめ		収穫14日前まで (雑草生育期 は種・定植前 又は陸間処理)			
ばれいしょ		雑草生育期 萌芽前処理	100~200	100~150	1回※2
		収穫21日前まで (雑草生育期 陸間処理)			
さといも		収穫30日前まで (雑草生育期 植付前又は陸間処理)	300~500	100~150	3回以内
		収穫7日前まで (雑草生育期 植付前又は陸間処理)			
さといも(葉柄)	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 挿苗前又は陸間処理)	300~500	100~150	2回以内
		収穫前日まで (雑草生育期 は種前又は陸間処理)			
やまのいも		収穫30日前まで (雑草生育期 萌芽前又は陸間処理)	300~500	100~150	3回以内
いちご、ピーマン、なす、 トマト、ミニトマト、 きゅうり、とうがらし類		収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は陸間処理)			
メロン、レタス、 非結球レタス		収穫30日前まで (雑草生育期 定植前又は陸間処理)	300~500	100~150	2回以内
キャベツ		収穫45日前まで (雑草生育期 定植前又は陸間処理)			
たまねぎ		収穫7日前まで (雑草生育期 定植前又は陸間処理)	300~500	100~150	2回以内
にんにく		収穫前日まで (雑草生育期 萌芽前又は陸間処理)			
ねぎ、すいか、 ブロッコリー		収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は陸間処理)	300~500	100~150	3回以内

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量（10aあたり）		総使用回数 ※1
			薬量 (ml)	希釈水量 (L)	
アスパラガス	一年生雑草	萌芽前(雑草生育期)	300~500	100~150	2回以内
		収穫前日まで (雑草生育期 陸間処理)			
にんじん	一年生雑草及び 多年生広葉雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 は種前又は陸間処理)	500	100~150	3回以内
		定植前(雑草生育期)			
ほうれんそう		収穫前日まで (雑草生育期 陸間処理)	500	100~150	2回以内※2
とうがん		収穫14日前まで (雑草生育期 陸間処理)			
にら		収穫14日前まで (雑草生育期 陸間処理)	500	100~150	2回以内
しそ		収穫14日前まで (雑草生育期 陸間処理)			
みょうが(花穂)	一年生雑草	みょうが(花穂)の収穫14日前まで ただし、花穂を収穫しない場合に あつては開花終了まで (雑草生育期 萌芽前又は陸間処理)	300~500	100~150	2回以内
みょうが(莖葉)					
ぎぼうし		収穫90日前まで (雑草生育期 陸間処理)	300	100	3回以内
甘草		収穫14日前まで (雑草生育期 定植前又は陸間処理)			
かのごそう		収穫14日前まで (雑草生育期 定植前又は陸間処理)	300	100	2回以内
ホップ		収穫3日前まで (雑草生育期 陸間処理)			
茶		摘採7日前まで (雑草生育期 陸間処理)	300	100	2回以内
茶(幼木)※3		雑草生育期 陸間・株間処理			
水田作物		耕起前(雑草生育期)	300~500	100~150	1回
水田作物(水田刈種)		雑草生育期			
水田作物(水田陸畔)	一年生雑草、 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~1000	100~150	2回以内
たばこ		雑草生育期 大土寄せ 陸間・陸間処理			
花き類・観葉植物	一年生雑草	雑草生育期 陸間処理	300~500	100~150	3回以内
樹木類		雑草生育期			
樹木等※4	多年生雑草		500~1000	100~200	3回以内
			1000~2000		

- ※1 総使用回数：本剤、グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数を示します。
- ※2 本剤とグルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数がある場合、本剤の総使用回数は適用表内の記載で、グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数は以下の通りです。
- ※3 ばれいしょ：3回以内（萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内）、にら：3回以内、とうがん：3回以内（定植後は2回以内）
- ※4 茶（幼木）に使用するときは樹高30cm以上、雑草の草丈20cm以下で処理してください。処理当年には摘採しないでください。薬液が付着した茶葉には、黄化、褐変、落葉などの症状を生じることがあるので、噴口を低くして芽や新葉にからないように注意して散布してください。
- ※5 樹木等の適用場所は、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、空地、のり面、鉄道等です。本剤の使用法は、雑草莖葉散布です。但し、樹木等の使用法は、植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草莖葉散布です。

■使用上の注意事項、詳細は製品ラベルをご参照ください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は園場等に放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。